



ZASTOSOWANIE LEKÓW PRZECZYSZCZAJĄCYCH DO KOLONOSKOPII

WAŻNE!!!!

DOUSTNE ŚRODKI CZYSZCZĄCE DOSTĘPNE SĄ W APTECE NA RECEPTĘ.

Receptę wystawia ośrodek kierujący na badanie.

Każdy z preparatów należy stosować według załączonej ulotki.

OPISY PRZYGOTOWANIA DO KOLONOSKOPII - WYBRANE PREPARATY

1. FORTTRANS

Schemat przygotowania dla osób, które badanie będą miały wykonane w godzinach przedpołudniowych :

- dawkowanie: 1 litr na 15 – 20 kg masy ciała, czyli przy średniej masie ciała ok. 80 kg przyjąć należy 4 litry roztworu
- przy większej masie ciała, dawkę należy zwiększyć: przy wadze 80 – 100 kg do 5 litrów oraz powyżej 100 kg do 6 litrów.
- w dzień przed badaniem od godziny ok. 16.00 rozpocząć należy przyjmowanie płynu, w tym celu 4 saszetki Fortransu rozpuścić należy w 4 litrach niegazowanej wody
- do wody można dodać sok z cytryny
- przygotowany roztwór należy wypić w ciągu 4 godzin – 1 szklanka co 15-20 minut
- nie wolno przyjmować już żadnych pokarmów stałych
- w dniu badania pozostać należy na czczo, bez jedzenia i picia

Schemat przygotowania dla osób, które badanie będą miały wykonane w godzinach popołudniowych:

- w przeddzień badania ok. godziny 18:00 należy rozpocząć przyjmowanie płynu, w tym celu 3 saszetki Fortransu należy rozpuścić w 3 litrach wody niegazowanej i wypić w ciągu 3 godzin
- rano, w dniu badania ok. godziny 8:00 należy rozpuścić 1 saszetkę preparatu w 1 litrze wody niegazowanej i płyn należy wypić w ciągu godziny
- nie wolno przyjmować żadnych pokarmów stałych
- jeżeli badanie będzie wykonane w znieczuleniu całkowicie dożylnym przyjmowanie płynów należy zakończyć 6 godzin przed badaniem

2. CITRAFLEET

Schemat przygotowania dla osób, które badanie będą miały wykonane w godzinach przedpołudniowych:

- należy wypić całe dwie porcje roztworu oraz dodatkowo 2 litry niegazowanych płynów po każdej porcji roztworu, co zapewni dobre oczyszczenie jelita
- w przeddzień badania pierwszą porcję należy przygotować ok. godziny 16:00
- zawartość saszetki rozpuścić w ok. 150 ml zimnej wody, podczas mieszania zawartość rozgrzeje się, należy odczekać do ochłodzenia i niezwłocznie wypić, mieszanina będzie mętna
- po wypiciu mieszaniny należy dodatkowo wypić 2 litry klarownego płynu
- drugą, identyczną porcję należy przygotować ok. godziny 20:00, saszetkę rozpuścić w 150 ml wody i popić 2 litrami klarownego płynu
- nie wolno przyjmować żadnych pokarmów stałych
- w dniu badania należy pozostać na czczo, bez jedzenia i picia

Schemat przygotowania dla osób, które badanie będą miały wykonane w godzinach popołudniowych:

- należy wypić dwie całe porcje roztworu oraz dodatkowo 2 litry niegazowanych płynów po każdej porcji roztworu
- w przeddzień badania pierwszą porcję należy zacząć przyjmować ok. godziny 21:00, saszetkę rozpuścić w 150 ml zimnej wody, podczas mieszania zawartość rozgrzeje się, należy odczekać do ochłodzenia i niezwłocznie wypić, mieszanina będzie mętna
- po wypiciu mieszaniny należy dodatkowo wypić 2 litry klarownego płynu
- w dniu badania drugą porcję należy zacząć przyjąć ok. godziny 6:00 rano
- jeśli badanie będzie wykonane w znieczuleniu całkowitym dożylnym przyjmowanie płynów należy zakończyć na 6 godzin przed badaniem.

3. EZICLEN

Schemat przygotowania dla osób, które badanie będą miały wykonane w godzinach przedpołudniowych:

- w przeddzień badania ok. godziny 18:00 należy wypić pierwszą dawkę preparatu – zawartość jednej butelki przelać do dołączonego kubka i rozcieńczyć wodą do kreski, wypić roztwór oraz w ciągu 2 godzin popić go 2 litrami niegazowanej wody
- drugą dawkę należy przygotować ok. godziny 20:00 i ponownie popić 2 litrami wody niegazowanej
- nie wolno przyjmować żadnych pokarmów stałych
- w dniu badania należy pozostać na czczo, bez jedzenia i picia

Schemat przygotowania dla osób, które badanie będą miały wykonane w godzinach popołudniowych:

- w przeddzień badania ok. godziny 20:00 należy przygotować pierwszą porcję roztworu
- jedną butelkę leku należy otworzyć i wlać jej zawartość do dołączonego kubka i rozcieńczyć wodą do kreski, wypić roztwór oraz popić go 2 litrami wody w ciągu 2 godzin
- w dniu badania rano ok. godziny 6:00 należy przygotować i przyjąć drugą porcję roztworu, roztwór z kubka oraz 2 litry niegazowanej wody
- jeśli badanie będzie wykonane w znieczuleniu całkowitym dożylnym przyjmowanie płynów należy zakończyć na 6 godzin przed badaniem

4. MOVIPREP

Schemat przygotowania dla osób, które badanie będą miały wykonane w godzinach przedpołudniowych:

- w dniu poprzedzającym badanie ok. godziny 16:00 należy otworzyć jedną torebkę i wyjąć saszetkę A i B, następnie obie saszetki rozpuścić w 1 litrze niegazowanej wody i wypić w ciągu 1 godziny. Roztwór powinien być przeźroczysty lub lekko mętny.
- 1 litr roztworu należy popić dodatkowo 1 litrem wody niegazowanej
- ok. godziny 20:00 należy przygotować drugą porcję preparatu Moviprep, rozpuszczony roztwór w 1 litrze wody należy wypić w ciągu godziny, czyli 1 szklanka co 15-20 minut, następnie należy jeszcze wypić co najmniej 1 litr wody
- nie wolno przyjmować żadnych pokarmów stałych
- w dniu badania pozostać należy na czczo, bez jedzenia i picia

Schemat przygotowania dla osób, które badanie będą miały wykonane w godzinach popołudniowych:

- w dzień poprzedzający badanie ok. godziny 19:00 należy otworzyć jedną torebkę i wyjąć saszetkę A i B, następnie obie saszetki rozpuścić w 1 litrze niegazowanej wody i wypić w ciągu 1 godziny. Roztwór powinien być przeźroczysty lub lekko mętny.
- 1 litr roztworu należy popić dodatkowo 1 litrem niegazowanej wody
- w dniu badania rano ok. godziny 6:00 należy przygotować kolejny litr roztworu w podobny sposób jak poprzednio, wypić go w ciągu 1 godziny i następnie popić co najmniej 1 litrem niegazowanej wody
- jeśli badanie będzie wykonywane w znieczuleniu całkowitym dożylnym, to przyjmowanie płynów należy zakończyć na 6 godzin przed badaniem